

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський національний медичний
університет

Кафедра психіатрії, наркології, медичної
психології та соціальної роботи



ВИВЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РОЗВИТКУ НЕРВОВОЇ АНОРЕКСІЇ (НА) СЕРЕД СУЧАСНОЇ МОЛОДІ




Виконала: Гордієнко П. О.
студентка 1 медичного
факультету, 4 курсу 2 групи

Науковий керівник: к. мед. наук,
доцент Зеленська Катерина
Олексіївна


Актуальність теми

Актуальність. Наразі проблема анорексії є дуже актуальною у сучасній медицині, адже за останні 20-30 років відмічається тенденція до зростання частоти розвитку НА серед сучасної молоді. НА — це психічне захворювання, поведінковий синдром, пов'язаний з порушенням харчування, відмінними рисами якого є одержимість втрати ваги, відмова в прийому їжі та страх набрати зайви кг.



Актуальність теми

Є багато причин, які призводять до розвитку цього захворювання, наприклад, спадковість, біологічні фактори, особливості особистості (до розвитку розладів харчової поведінки (РХП) найбільш схильні перфекціоністи та obsесивні типи особистості) та масова культура.



Мета роботи


Мета. Вивчити схильність до розвитку нервової анорексії серед сучасної молоді за допомогою використання скринінгових методик.



Матеріали та методи

Матеріали та методи. Було проведено анкетування 37 молодих людей віком від 18 до 21 року (середній вік 20,5 років) на предмет ставлення до прийому їжі.

37 хворих. Середній вік пацієнтів складав $20,5 \pm 2,5$ роки




Матеріали та методи

Використовувались наступні методики: “Тесту відношення до прийому їжі” (EAT-26), “Шкала оцінки харчової поведінки” (ШОХП) та було визначено індекс маси тіла (ІМТ) за Кетле.




Матеріали та методи

Також було враховано умови проживання молоді




Результати дослідження

За результатами анкетування за тестом ЕАТ-26, що є скринінговим методом визначення схильності до НА, було встановлено наступне:




Результати дослідження

Опитування за ШОХП встановило:



Результати дослідження

Також було враховано
значення ІМТ:



ВИСНОВКИ

- 1) За даними EAT-26 більшість молодих людей мали понижений показник (67,6%) та середній (27%), що може свідчити про середній ступінь схильності до НА
- 2) За результатами ШОХП більшість були незадоволені власним тілом - 72,9%
- 3) Мали недовіру у міжособистісних стосунках — 78,4% та перфекціонізм — 62,2%
- 4) Отже, ми можемо спостерігати певну тенденцію до безпідставного прагнення худорби, при нормальних значеннях ІМТ у більшості опитаних (59,4%), що у майбутньому може призвести до тяжких наслідків.

Дякую за увагу!

Будьте здорові!



STAY HOME

