

Класифікація голодування

Підготувала Мала Олена

BY MALA LENA

I. За походженням:

1. Фізіологічне голодування періодично повторюється у деяких видів тварин в зв'язку з особливими умовами їх проживання або розвитку, характерне для деяких видів тварин під час зимової (бабаки, ховрахи) або літньої (плазуни) сплячки, у період нересту (лососеві риби).

1

2

2. Патологічне голодування - це критична форма недоїдання, загрозливий дефіцит споживання калорій потрібних для підтримки життя організму. Це стан, що виникає в тих випадках, коли організм не одержує поживних речовин або одержує їх у недостатній кількості, або ж не засвоює їх внаслідок хвороби.

3

Лікувальне голодування – дозоване голодування, яке використовують з лікувальною метою.



II. Голодування може бути первинним і вторинним.

Первинне голодування виникає в результаті нестачі їжі.

Вторинне голодування є результатом інших причин (хвороб, психічних чинників).



BY MALA LENA


III. Залежно від суті виділяють такі види голодування

- повне голодування: із уживанням води і без уживання води (абсолютне);
- неповне голодування (недоїдання) – в організм надходять усі поживі речовини, але в недостатній за калорійністю кількості;
- часткове (якісне) голодування – недостатнє надходження з їжею однієї або кількох необхідних організму речовин при нормальній калорійності їжі. Залежно від того, яких компонентів бракує в їжі, виділяють: білкове, жирове, вуглеводне, вітамінне, мінеральне, мікроелементне, водне голодування. Часто буває поєднання неповного голодування (калорійна недостатність) з якісним (неповноцінна їжа).



BY MALA LENA

Повне голодування з водою розвивається при повній відсутності їжі з можливістю необмеженого прийому води.



BY MALA LENA

Дякую за увагу!

Підготувала Мала Олена

BY MALA LENA